

## **ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE 1% schiuma cutanea (p.a. piroxicam)**

### **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

#### **ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE 1% schiuma cutanea Piroxicam**

Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE
3. Come usare ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE e a cosa serve**

ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE contiene il principio attivo piroxicam che appartiene ad una categoria di farmaci chiamati antinfiammatori non steroidei (FANS), usati per il trattamento delle infiammazioni e per alleviare il dolore.

ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE si usa per il trattamento locale dei dolori e delle infiammazioni alle articolazioni, ai muscoli, ai tendini ed ai legamenti causati da un trauma o da malattie reumatiche infiammatorie.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di tempo.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE**

##### **Non usi ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE**

- se è allergico al piroxicam o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6.

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o, al farmacista prima di usare ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE .

Informi il medico e sospenda immediatamente il trattamento:

- se sviluppa gravi reazioni allergiche come eruzione cutanea, gonfiore al viso, sibilo respiratorio o difficoltà nella respirazione. Queste reazioni possono verificarsi durante il trattamento specie se prolungato con i prodotti per uso cutaneo. Il suo medico le indicherà una terapia sostitutiva.
- se manifesta gravi reazioni cutanee come dermatiti esfoliative (arrossamento intenso della pelle, con desquamazione a scaglie o a strati), reazioni vescicolo-bollose (Sindrome di Stevens-Johnson, caratterizzata da pelle con bolle rosse, corrosa, sanguinolenta o coperta da una crosta e Necrolisi Epidermica Tossica, caratterizzata da bolle e desquamazione dello strato superficiale della pelle, soprattutto nelle prime settimane di trattamento).

Queste reazioni non sono state segnalate con l'uso di piroxicam per via cutanea, tuttavia non si può escludere la possibilità che si verifichino.

## **ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE 1% schiuma cutanea (p.a. piroxicam)**

Se sviluppa la sindrome di Stevens-Johnson o la Necrolisi Epidermica Tossica (TEN) in seguito all'uso di ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE, non usi mai più questo farmaco.

- se manifesta gravi problemi ai reni, potrebbe aver sviluppato alcune patologie dovute all'alterazione della funzionalità renale.
- Vedere anche le informazioni riportate al paragrafo 4.

### **Altri medicinali e ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

#### *Gravidanza*

Se è incinta o pensa di esserlo: non è consigliato l'uso di ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE schiuma. Informi il suo medico che valuterà se l'utilizzo è strettamente necessario.

#### *Allattamento*

Se sta allattando: non è consigliato l'uso di ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE schiuma.

#### *Fertilità*

ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE può causare infertilità reversibile. È consigliabile che interrompa il trattamento con questo medicinale se lei ha difficoltà di concepimento o si sta sottoponendo a degli esami per valutare la sua fertilità.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non è stato riportato alcun effetto di ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE schiuma sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

### **ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE contiene propilenglicole**

Questo medicinale contiene propilenglicole che può causare irritazione alla pelle.

### **3. Come usare ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

#### *Adulti*

Applicare sulla cute 2-3 volte al giorno 3-5 cm di schiuma o più a seconda dell'estensione della parte interessata, massaggiando delicatamente per favorirne l'assorbimento.

#### *ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE 1% schiuma cutanea*

Togliere il cappuccio di protezione, erogare la schiuma sulla parte interessata e richiudere.

#### **Se usa più ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE di quanto deve**

Non sono noti casi di sovradosaggio.

**Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.**

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

**Se dovesse manifestare uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa il trattamento con ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE e informi immediatamente il suo medico oppure si rechi al più vicino ospedale.**

- gravi reazioni allergiche e irritazioni locali (specie nell'uso se prolungato);
- orticaria;

## **ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE 1% schiuma cutanea (p.a. piroxicam)**

- gravi reazioni cutanee (Sindrome di Stevens-Johnson, caratterizzata da pelle con bolle rosse, corrosa, sanguinolenta o coperta da una crosta Necrolisi Epidermica Tossica, caratterizzata da bolle e desquamazione dello strato superficiale della pelle);
- gravi reazioni infiammatorie della pelle di natura immunitaria (dermatite da contatto, eczema) e reazioni cutanee a seguito di esposizione della pelle al sole;
- difficoltà respiratoria causata da un restringimento dei bronchi.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo {Scad}.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Il contenitore sotto pressione non va forato, non deve essere avvicinato, anche se vuoto, a fonti di calore, non congelare e proteggere il medicinale dalla luce solare diretta.

Non esporre a temperature superiori a 50°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE**

Il principio attivo è il piroxicam.

100 g di soluzione di *ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE 1% schiuma cutanea* contengono 1 g di piroxicam.

Gli altri componenti sono:

propilenglicole, acido cloridrico, sodio idrossido, sodio fosfato monobasico monoidrato, nicotinamide, polisorbato 80, povidone, alcool etilico, alcool benzilico, essenza lavanda, essenza nerolene, acqua depurata.

Propellente: propano-butano-isobutano

#### **Descrizione dell'aspetto di ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE e contenuto della confezione**

*ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE 1% schiuma cutanea*

Contenitore in alluminio verniciato provvisto di valvola ed erogatore, chiuso da un cappuccio di protezione, riempito con 45 g di soluzione e pressurizzato con 5 g di miscela di gas.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare

Farmitalia S.r.l.

Viale Alcide De Gasperi, 165/B

95127 Catania

Italia

#### **Produttore**

Farmol Health Care S.r.l.

Via Del Maglio, 6

23868 Valmadrera (LC)

Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

**Marzo 2021**